

## Informatiebrief Longfunctieonderzoek in de Huisartsenpraktijk

Uw huisarts/praktijkondersteuner adviseert u om een afspraak te maken voor een longfunctieonderzoek. Uit de meetwaarden hiervan kan worden vastgesteld hoe het met uw longen gesteld is.

### *Algemene voorbereiding*

Bepaalde longmedicatie kunnen de uitslag van het onderzoek beïnvloeden:

- Komt u voor het **eerst** voor longfunctieonderzoek, dan moet u uw longmedicatie **stoppen** volgens onderstaand schema.
- Bij elk volgend longfunctieonderzoek moet u de longmedicatie doorgebruiken, tenzij de huisarts/praktijkondersteuner anders voorschrijft.

24 uur voor het onderzoek	12 uur voor het onderzoek
Spiriva (Tiotropium)	Airomir
	Atrovent
	Bricanyl
	Fluticason/Flixotide
	Foradil
	Foster
	Formeterol/Oxis
	Serevent
	Seretide
	Ventolin (Salbutamol)

### *Het onderzoek*

U krijgt een mondstuk in uw mond en een neusklem op uw neus. Via het mondstuk staat u in verbinding met de meetapparatuur. Vervolgens meet de longfunctieanalist de hoeveelheid lucht die u in- en uitademt. Hiervoor moet u een aantal verschillende ademhalingsoefeningen doen. Deze ademhalingsoefeningen herhaalt u enkele keren. Het kan voorkomen dat uw arts ook een meting wil doen na toediening van medicijnen. Dan krijgt u van ons een medicijn in te ademen. Als dit medicijn is ingewerkt, wordt het onderzoek herhaald. Het onderzoek zal twintig tot veertig minuten in beslag nemen.

### *Verhindert?*

Als u niet op de afgesproken dag kunt komen, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak maken? Wij kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

### *Vragen?*

Mocht u nog vragen hebben over het longfunctieonderzoek dan kunt u contact opnemen met de assistente.